

ÁRVORES

ULMEIRO



NOME BOTÂNICO

Ulmus minor

FAMÍLIA

Ulmaceae

CADUCIDADE

Caducifólia



- **TAMANHO** | até 30m de altura
- **ÉPOCA DE FLORAÇÃO** | fevereiro-março
- **ÉPOCA DE FRUTIFICAÇÃO** | abril
- **DISTRIBUIÇÃO NACIONAL** | Portugal continental
- **ECOLOGIA** | Fundos de vales, margens de linhas de água, sebes ou orlas de matagais, em solos húmidos, ricos em nutrientes.

Árvore com copa ampla, arredondada e um pouco irregular com folhagem densa. Tronco com ritidoma acinzentado, muito áspero com cristas longitudinais, mais ou menos profundas de acordo com a idade da árvore. As folhas são simples, alternas, ovadas, pontiagudas, com a margem serrada, assimétricas na base. As flores são, muito precoces, agrupadas em glomérulos de cor esverdeada ou avermelhada, quase sem pecíolos. Os frutos são sâmaras, aladas, achatadas que parecem “folhinhas” amontoadas.



OBSERVAÇÃO:

A madeira do ulmeiro é fácil de trabalhar e muito resistente à putrefação quando mantida húmida, pelo que se emprega na construção naval e em alicerces de minas. A casca do ulmeiro tem-se empregado em medicina como adstringente, sudorífero e em forma de pomada para as infeções da pele. A grafiose (doença provocada pelo fungo *Ophiostoma novo-ulmi*) tem afetado muito as populações naturais, impedindo o seu cultivo, e ameaçando a espécie de extinção.



Odivelas
CÂMARA MUNICIPAL