



ARBUSTOS

ABRUNHEIRO-BRAVO

NOME BOTÂNICO

Prunus spinosa

FAMÍLIA

Rosaceae

CADUCIDADE

Caducifólia



- TAMANHO | até 6m de altura
- ÉPOCA DE FLORAÇÃO | fevereiro-abril
- ÉPOCA DE FRUTIFICAÇÃO | junho-julho
- DISTRIBUIÇÃO NACIONAL | Norte e centro de Portugal continental.
- ECOLOGIA | Matas e orlas de bosques. Preferentemente em solos de origem calcária ou margosa, mais raramente em substratos siliciosos.

Arbusto muito espinhoso e de ramificação abundante. As folhas são alternas, simples e lanceoladas, de margem serrilhada e surgem após a floração. As flores são numerosas, pequenas com cinco pétalas glabras, brancas ou raramente rosadas. A floração é muito rápida e as flores libertam um aroma característico semelhante à amêndoa amarga. O fruto (abrunho) é uma drupa globosa, comestível, azul-escura quando madura.



OBSERVAÇÃO:

O abrunheiro é uma fonte de alimento para as abelhas e várias espécies de lagartas de borboletas (ex. *Satyrrium pruni*). A densa ramagem proporciona um ótimo local para a nidificação de pardais, tentilhões e rouxinóis. É uma planta muito apreciada como ornamental pela sua intensa floração. Na medicina popular, a infusão de folhas desta planta é usada no tratamento de infeções da garganta, como amigdalites e laringites, tosse, bronquite, além de ajudar na cicatrização de acne e furúnculos.



Odivelas
CÂMARA MUNICIPAL