

ARBUSTOS

ALIAGA-DA-ESTREMADURA



NOME BOTÂNICO

Genista tournefortii

FAMÍLIA

Fabaceae

CADUCIDADE

Caducifólia



- TAMANHO | 0,2-0,4cm de altura
- ÉPOCA DE FLORAÇÃO | março - junho
- ÉPOCA DE FRUTIFICAÇÃO | verão
- DISTRIBUIÇÃO NACIONAL | Estremadura
- ECOLOGIA | Matos baixos, frequentemente em clareiras de bosques perenifólios. Em substratos geralmente básicos, derivados de calcários.

Pequeno arbusto pouco espinhosos com caules felpudos com 4-5 nervuras. Os caules jovens têm folhas simples, numerosas e alternas já os ramos velhos são desprovidos de folhas, mas com espinhos não muito agressivos. Os ramos desenvolvem-se junto ao solo tornando-se ascendentes nas extremidades. As flores, de corola amarela-dourada, muitas vezes com quilha esverdeada quando seca surgem em cacho, em inflorescências terminais, que agrupam cerca de 6 a 30 flores. Os frutos são vagens estreitas, achatadas, encurvadas como uma foice.



OBSERVAÇÃO:

Arbusto endêmico do centro e oeste da Península Ibérica com grande importância ecológica, por colonizar, juntamente com outras espécies do género *Genista*, as florestas degradadas pelos fogos e pela desflorestação tornando-se dominantes e características da paisagem.



Odivelas
CÂMARA MUNICIPAL