

BORRAZEIRA, SALGUEIRO-PRETO



NOME BOTÂNICO

Salix atrocinerea

FAMÍLIA

Salicaceae

CADUCIDADE

Caducifólia



- TAMANHO | até 10m de altura
- ÉPOCA DE FLORAÇÃO | fevereiro - junho
- ÉPOCA DE FRUTIFICAÇÃO | março
- DISTRIBUIÇÃO NACIONAL | Portugal continental.
- ECOLOGIA | Margens de cursos de água, lagoas e charcos. Em solos húmidos, por vezes nitrificados. Com preferências algo acidófilas.

Arbusto de porte arbóreo com ramos direitos e nodosos com ritidoma cinzento, liso tornando-se fendido e castanho.
Folhas simples, lanceoladas muito verdes na página superior e tomentosas na página inferior.
Inflorescências em amentilhos que aparecem antes das folhas.
O fruto é uma cápsula tomentosa.



OBSERVAÇÃO:

Por florescer cedo é uma importante espécie melífera.
Adequada para estabilizar terrenos e combater a erosão, devido ao seu extenso sistema radical, constituindo também uma boa barreira contra o vento.
Utilizada na medicina popular no combate às insónias e como febrífuga (combate a febre e evita o seu aumento). Este efeito deve-se à sua riqueza em ácido salicílico (um seu derivado é um dos medicamentos mais utilizados no Mundo, a aspirina).

