



ARBUSTOS

MEDRONHEIRO

NOME BOTÂNICO

Arbutus unedo

FAMÍLIA

Ericaceae

CADUCIDADE

Perenifólia



- TAMANHO | 5-8 m de altura
- ÉPOCA DE FLORAÇÃO | outono - inverno
- ÉPOCA DE FRUTIFICAÇÃO | novembro - janeiro
- DISTRIBUIÇÃO NACIONAL | Portugal continental
- ECOLOGIA | Matagais em vertentes e barrancos, sombrios ou soalheiros. Por vezes dominante originando medronhais. Indiferente edáfico, em diversos tipos de solos, incluindo rochosos.

Arbusto de porte arbóreo e copa arredondada. Tronco contorcido com ritidoma fendilhado, cor canela. Folhas simples, alternas, serradas de um verde intenso e lustroso.

As flores aromáticas dispostas em panículas terminais, pendentes, com corola branca-rosada.

Os frutos são bagas globosas comestíveis de cor verde no início, passando a amarelo e vermelho com a maturação.



OBSERVAÇÃO:

O medronheiro é uma espécie melífera, cultivada como ornamental e em pomares para a obtenção do fruto. Os frutos são utilizados na produção de aguardente ou vinagre. A floração ocorre em simultâneo com o amadurecimento e queda dos frutos do ano anterior, pelo que podem existir simultaneamente flores e frutos. É considerada uma espécie pioneira que cresce facilmente em solos pobres e muito resistente ao fogo.



Odivelas
CÂMARA MUNICIPAL